



Carnivores et rats dans nos maisons :

La Fouine est souvent confondue avec sa cousine la Martre, très proche visuellement. Si la Martre ne semble pas fréquenter les maisons, la Fouine peut se rencontrer dans les milieux naturels, notamment boisés.


Le Putois, autre petit carnivore de la même famille (mustélidés), peut quant à lui fréquenter occasionnellement les bâtiments. On le trouve dans le bocage, les milieux boisés et humides.

Voici quelques clés pour distinguer ces trois espèces.



Fouine *Martes foina - Fouin*

Fourrure brun-gris, poil de jarre* plus épars, poil de bourre* gris



Franck Simonnet




Martre des pins *Martes martes - Mart*

Fourrure brune, plus foncée poil de jarre* plus dense

Oreilles plus grandes, liseré clair plus marqué

Truffe brune

Bavette jaunâtre à orangée, arrondie sur la gorge, descendant peu ou pas sur les pattes antérieures.



Xavier Grémillet



Putois d'Europe *Mustela putorius - Pudask Europa*

Fourrure brune, poils de jarre* clairsemés, poil de bourre* jaune pâle

Toutes petites oreilles, jaunâtres ou blanchâtres

Masque facial blanc ou jaunâtre en deux parties, se rejoignant parfois :

- tâche blanche sur le menton et la lèvre supérieure, remontant plus haut que le museau
- tâches en arc de cercle autour des yeux



* La fourrure des Mammifères est en général composée de deux types de poils : le poil de bourre, court et dense, formant une sorte de duvet ; et le poil de jarre, plus long et plus épais formant une couche extérieure protectrice.

Attention risque de confusion !

Dans les bâtiments, on peut trouver deux espèces de rats :


Le Rat noir, le plus rare, occupe surtout les greniers, hangars... C'est un arboricole très bon grimpeur. Originaire d'Inde et introduit en Europe il y a 2 000 ans, c'est le rat responsable des épidémies de peste.

Le Rat surmulot (Rat brun, Rat gris ou Rat d'égoût), le plus répandu, est originaire de Chine ou de Mongolie et fut introduit en France au XVIII^{ème} siècle. Il fréquente les caves, entrepôts, bâtiments agricoles... mais aussi des habitats plus aquatiques (c'est un bon nageur).


Les deux espèces sont parfois difficiles à distinguer, les couleurs n'étant pas toujours aussi distinctes. Voici quelques clés pour vous aider à les identifier :



Rat noir *Rattus rattus - Razh du*



Rat surmulot *Rattus norvegicus - Razh rous*



Dessins : Céline Leroq (CPIE du Cotentin)

Les rats ne sont pas les seuls rongeurs à apprécier nos habitations : la souris grise et le Mulot sylvestre les fréquentent eux aussi (voir la brochure «Les mammifères des jardins bretons»).

Pour éviter d'avoir des rats dans sa maison, dissuadez-les d'y accéder ! Fermez tous les accès souterrains (canalisations, gaines, soupiraux).

Comme la Fouine ou le Lérot, les rats utilisent les éléments verticaux pour accéder aux combles (plantes grimpantes, troncs,

gouttières...). Limitez-les ou équipez-les de manchons munis de pics.

Conservez votre nourriture en boîtes métalliques ou bocaux en verre.

Les pièges sont préférables à l'empoisonnement, à éviter.