

ENQUETE CAMPAGNOL AMPHIBIE

Date : Observateur(s) :

Commune : Lieu-dit :

Présence de végétation favorable (herbacée des milieux humides > 30 cm) :

☐ oui ☐ non

Description de la végétation favorable :

Taux de recouvrement végétation favorable (herbacée des milieux humides > 30 cm) :

☐ + de 50 % ☐ réduite ou clairsemée

Présence d'eau libre (visible) :

☐ oui ☐ non

Présence d'une microtopographie :

☐ oui ☐ non

Surface de l'habitat favorable :

☐ > à 100 m² ☐ < à 100 m²

Campagnol amphibie : ☐ Présent ☐ Absent

Indices observés : ☐ Crottiers ☐ Coulées ☐ Réfectoires ☐ Empreintes

Densité (sur 100 m) : ☐ Rares (1 à 2 crottiers ou réfectoires ou crotte isolée, absence de coulées)

☐ Clairsemés (quelques crottiers et réfectoires, coulées discrètes et localisées)

☐ Fréquents (crottiers et réfectoires bien présents, coulées marquées)

☐ Abondants (crottiers et réfectoires omniprésents, coulées très apparentes, façonnant la microtopographie)

Autres espèces

Type de contact →	fèces	empreintes	restes repas	obs. directe	autres
☐ Camp. « type » agreste	☐	☐	☐	☐	
☐ Ragondin	☐	☐	☐	☐	
☐ Rat musqué	☐	☐	☐	☐	
☐ Rat surmulot	☐	☐	☐	☐	
.....	☐	☐	☐	☐	
.....	☐	☐	☐	☐	

Remarques :